

禁煙して、
よかったです。



タバコのこと、
考え方直して
みませんか。

禁煙したい人、応援します。

詳しくは当院へご相談ください。



HALEONジャパン株式会社

HALEONが所有またはライセンスを受けた商標
© 2024 HALEON またはライセンサー

TTS061A
2024年9月改訂

HALEONジャパン株式会社

よかった理由 1

病気のリスクが下がる。

禁煙を開始すると、すぐ体内に変化があらわれます。時間の経過とともに、さまざまな病気のリスクが低下し、からだの機能が改善します。

禁煙のメリット～健康編～

20分後	血圧が最後のタバコを吸う前のレベルに戻る
8時間後	血液中の一酸化炭素濃度が正常に戻る
24時間後	心臓発作のリスクが下がり始める
2週間～3ヶ月後	肺活量が増え、呼吸がラクになる
1～9ヶ月後	せきが減り、肺機能が改善する
1年後	心臓病のリスクが喫煙者の半分以下に下がる
5年後	脳卒中のリスクが非喫煙者と同等になる
10年後	肺がん、口腔がん、咽頭がん、食道がん、膀胱がん、腎臓がん、膵臓がんで死亡するリスクが大幅に下がる
15年後	心臓病のリスクが非喫煙者と同等になる




よかった理由 2

お金が貯まる。

習慣的にタバコを1日1箱吸っている人は、実はタバコ代が膨大な金額に。禁煙すると、そのお金でいろいろなことができます。

禁煙のメリット～経済編～



禁煙すると食事がおいしくなり、ついつい食べすぎてしまいがち。お料理は脂っこいものを控え、薄味を心がけてください。出来るだけ、野菜を多く摂ることをお薦めします。

タバコの煙には有害成分がたくさん。

タバコの煙には約5300種類の化学物質が含まれ、なかでも、タール、ニコチン、一酸化炭素は、タバコの3大有害化学物質と呼ばれています。タールには

ベンゾ[a]ピレンをはじめ、アミン類など数十種類の発がん物質が含まれ、ニコチンには依存性があり、心拍数の増加や血圧を上昇させる作用などがあります。一酸化炭素には動脈硬化を促進させる作用があるといわれています。有害化学物質の主なものは、以下のとおりです。

さまざまなものになる。

考え方したい理由

2

喫煙がさまざまな病気の原因となることはよく知られていますが、呼吸器疾患だけでなく循環器疾患、消化器疾患、糖尿病、そして歯科疾患までもが、喫煙による影響を受ける喫煙関連疾患であることがわかつています。

「因果関係を推定するのに十分である（根拠十分・レベル1）」とする

主な喫煙関連疾患等は以下のとおりです。

喫煙者がなりやすくなる病気など（根拠十分；レベル1）

がん

- 鼻腔・副鼻腔がん
 - 口腔・咽頭がん
 - 喉頭がん
 - 食道がん
 - 肺がん
 - 肝臓がん
 - 胃がん
 - 脾臓がん
 - 膀胱がん
 - 他に 子宮頸がん
- その他の疾患
- 脳卒中 ニコチン依存症
 - 歯周病
 - 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
 - 呼吸機能低下
 - 結核(死亡)
 - 虚血性心疾患
 - 腹部大動脈瘤
 - 末梢性の動脈硬化症
 - 2型糖尿病の発症

妊娠・出産

- 早産
- 低出生体重・胎児発育遅延
- 乳幼児突然死症候群(SIDS)



タバコ煙の種類とタバコ煙に含まれる主な有害化学物質

	種類	主な有害化学物質
タバコ	タバコ特有成分	タバコ特異的ニトロアミン類 (NNK, NNN, NAT, NAB) ニコチン
	粒子成分 (タール)	多環芳香族炭化水素類(ナフタレン、ベンゾ[a]ピレンなど) 芳香族アミン類(4-アミノビフェニル、o-トルイジンなど) フェノール類(フェノールなど) 重金属類、自然放射性物質(ポロニウム-210など)
	ガス成分	一酸化炭素、窒素化合物 カルボニル類(ホルムアルデヒドなど) 揮発性有機化合物(ベンゼンなど) 揮発性ニトロアミン類

ご存じですか？ 受動喫煙。

タバコの煙には、喫煙者が直接吸い込む「主流煙」と、点火部から立ち上る「副流煙」があります。有害成分は不完全燃焼時により多く発生するため、副流煙は主流煙と比べてより多くの有害化学物質を含んでいるとされています。受動喫煙は、タバコを吸わない人に喫煙関連疾患をもたらす可能性を高めます。

「因果関係を推定するのに十分である(根拠十分・レベル1)」とする喫煙関連疾患等は以下のとおりです。

「肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、臭氣・不快感および鼻の刺激感、小児の喘息の既往、乳幼児突然死症候群(SIDS)」

厚生労働省「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する報告書」(2016年)P.3より抜粋

よかった理由

3

自分が気持ちいい。 + まわりの人も喜ぶ。

目覚めがさわやか。せきやたんが止まる。
口の中がさっぱりし、味覚や嗅覚がもどる。

食べ物がおいしい。
人に不快感を与えて
いないので安心。



カーテンや衣服、車などに
ニオイがつかなくなり、
家具や畳、カーペットなどを
焦がしたり、火事の心配をすることも
なくなります。
また、灰皿などの清掃の手間も、
省けるようになります。



質問

禁煙のつらい時期をどう乗り越えればよいのでしょうか。


答

禁煙補助薬で禁煙へ。

禁煙成功の秘訣。

それは、離脱症状をどう乗り越えるかです。ニコチン離脱症状とは、タバコが吸いたい、イライラする、落ち着かない、頭痛がする、体がだるい、眠いなどの、いわゆる禁断症状。これらは禁煙によって、ニコチンづけになっている体から、ニコチンが抜け出していくためにみられるものです。一般的には、禁煙開始後2~3週間つづきます。この時期を上手く乗り越えれば、禁煙成功はもう間近。

禁煙後にあらわれる離脱症状に対して、禁煙補助薬を使用して、禁煙を成功に導くという方法もあります。禁煙補助薬にはニコチンを含むお薬とニコチンを含まないお薬の2種類があります。まずは、やめようという意思が大切ですが、何も使わずにガマンするよりは、禁煙しやすくなる場合もあります。



詳しくは、
医師または薬剤師に
おたずねください。



チェックしてみましょう

Q ニコチン依存度のチェック

次の6項目について、あてはまる回答の点数を合計してください。

		点数
Q1 起床後何分で最初の喫煙をしますか。	5分以内	3
	6～30分	2
	31～60分	1
	61分以上	0
Q2 寺院や、図書館、映画館など、喫煙を禁じられている場所で禁煙することが難しいですか。	はい	1
	いいえ	0
Q3 1日の喫煙の中でどれが一番やめにくですか。	朝、最初の1本	1
	その他	0
Q4 1日に何本吸いますか。	31本以上	3
	21～30本	2
	11～20本	1
	10本以下	0
Q5 他の時間帯より、起床後数時間に多く喫煙しますか。	はい	1
	いいえ	0
Q6 ほとんど1日中、床に伏しているような病気の時でも喫煙しますか。	はい	1
	いいえ	0

Heatherton TF ほか. Br J Addict. 1991; 86:1119-1127より
※禁煙治療に保険が適用されるかどうかのチェックではありません。

0～3点
ニコチン依存度が低い
「ライトスモーカー」です。

4～6点
ニコチン依存度が普通の
「ミドルスモーカー」です。

あなたの
合計点数
点

7～10点
ニコチン依存度が高い
「ヘビースモーカー」です。



Heatherton TF ほか. Br J Addict. 1991; 86:1119-1127より

※禁煙治療に保険が適用されるかどうかのチェックではありません。